Housenky můr na cukrovce – září 2025

Ing. Kamil Holý, Ph.D.
Tým integrované ochrany zemědělských plodin proti škůdcům
Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v.v.i., Praha-Ruzyně

Od začátku září se opět v některých porostech cukrovky vyskytují housenky můr. Výskyt je lokální, pouze v některých oblastech nebo na některých polích v rámci jednoho podniku. Housenky jsou zatím malé, snadno se přehlédnou, ale při zanedbání monitoringu mohou do konce září způsobit až holožíry.

Můra kapustová a můra zelná

- jsou polyfágní druhy, které v podzimním období napadají cukrovou řepu
- v posledních letech je hojnější můra kapustová, ale často se vyskytují v různém poměru na pozemku současně
- malé housenky i vajíčka jsou ukryty na spodní straně listu
- počátek napadení se projeví malými otvory v listech
- otvory se postupně zvětšují, při přemnožení dochází k holožírům

monitoring

- pravidelná prohlídka porostů – min. 1x týdně
- u větších polí na více místech – může škodit jen ohniskově
- děrování listů je vidět na několik metrů – prohlédnout poškozené listy ze spodní strany
    - housenky jsou zelené, nenápadné, někdy podélně s listovými žebry

ochrana

- proti nejmladším housenkám před zničením listové plochy
- čím starší/větší housenky, tím žravější – v závislosti na teplotě mohou porost sežrat během týdne
- housenky na listech jsou dobře zasažitelné insekticidy, večerní aplikace jsou účinnější – housenky mají noční aktivitu
- ochranu volit v závislosti na plánovaném termínu sklizně – porosty krátce před sklizní je zbytečné ošetřovat – housenky zničí pouze listy, bulvu nepoškodí

K. Holý 2025: Informační leták, CARC, září 2025
výzkum byl podpořen projektem MZe RO-0425

otvory v listech – příznaky začátku žíru housenek

výzkum byl podpořen projektem MZe RO-0425

vysoký počet otvorů a malá velikost housenek signalizuje brzké vysoké % poškození listové plochy – možná až holožír

výzkum byl podpořen projektem MZe RO-0425



housenky jsou zatím malé – úbytek listové plochy bude zrychlovat

výzkum byl podpořen projektem MZe RO-0425

starší housenky jsou barevnější, ale na listech též většinou dobře maskované

výzkum byl podpořen projektem MZe RO-0425