

Tango[®] Super – fungicid, na který se můžete spolehnout. Dlouhodobě!

Po změně dotačního programu v cukrovce se rentabilita a nákladovost investic do pěstování cukrovky dostává do popředí. Tango Super je jeden z nejpoužívanějších fungicidů v České republice, který nabízí vysokou rentabilitu s univerzálním použitím v cukrovce za výbornou cenu.

V našich pokusech v Evropě, ale i v České republice byl potvrzen nárůst výnosu cukrovky v průměru o 4 % oproti neošetřené kontrole. Účinnost na choroby je také vysoká. Proti cercosporióze dosáhl přípravek Tango Super v 51 pokusech téměř účinnosti **80 %**, proti padlí **93 %** (v 35 pokusech), proti rzivosti **91 %** (v 58 pokusech) a dokonce má efekt i na ramuláriovou listovou skvrnitost. Tango Super je váš spolehlivý ochránce porostů cukrovky proti houbovým chorobám s vysokou rentabilitou.

Tango Super je systémově a kontaktně působící fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Po aplikaci je přijímán nadzemními částmi rostlin a rozváděn po celé rostlině. Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou reziduální účinnost po dobu 3–4 týdnů proti cercosporové


listové skvrnitosti řepy (*Cercospora beticola*), ale i proti padlí řepy, rzivosti řepy a ramuláriové skvrnitosti v cukrovce.

Tango Super obsahuje dvě vzájemně se podporující účinné látky v moderní formulaci. Účinná látka **epoxiconazole** ze skupiny triazolů blokuje syntézu a tím tvorbu buněčných membrán patogena. Má širokospektrální preventivní a kurativní účinek. Vynikající účinek má především na rzi a braničnatky. Účinná látka **fenpropimorph** ze skupiny morfolinů inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický protektivní a kurativní účinek. V rostlině je translokována akropetálně. Vyniká výbornou účinností proti padlí, kde nebyla doposud zjištěna žádná rezistence, s vedlejším účinkem na skvrnitosti. Působí zároveň jako vynikající nosič účinné látky do rostliny.

Doporučené dávkování

Proti cercosporióze ošetřujeme preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby, obvykle v polovině července. Doporučená dávka je **1 l.ha⁻¹** v množství vody 300 l.ha⁻¹.

Obr. 1. Snížení intenzity napadení cercosporovou skvrnitostí



Obr. 2. Snížení intenzity napadení padlím řepy

