

# Difure Pro – komplexní fungicid do cukrové řepy společnosti Belchim

Roman Lesa – Belchim

Do povědomí odborné veřejnosti se belgická společnost **Belchim Crop Protection** dostala zejména přípravky na ochranu vinné révy a brambor. V posledních letech dochází k rozšiřování pole působnosti o produkty do obilnin, řepky, kukuřice a v neposlední řadě i cukrové řepy. V letošním roce přichází společnost se zcela novým fungicidem pro kontrolu nejčastějších listových chorob cukrovky a krmné řepy, **Difure Pro**.

## DIFURE<sup>®</sup> pro

### Základní charakteristika

**Difure Pro** je zcela novou kombinací azolů do cukrovky a krmné řepy. Jedná se o kombinaci dvou účinných látek, **difenokonazol 150 g.l<sup>-1</sup>** a **propikonazol 150 g.l<sup>-1</sup>**. Obě účinné látky patří do chemické skupiny DMI triazolů, kdy působí jako demetylační inhibitor. Difure Pro je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně (směrem nahoru) a transla-minárně (přípravek se dostane skrz pletiva i na neošetřenou stranu listu).

### Cílové choroby

Působí zejména proti cercosporové skvrnitosti (*Cercospora beticola*), která může snížit výnos o 10–30 %. Jistě máte ještě v živé paměti silný tlak cercosporiázy v roce 2012. Mezi další choroby patří ramulariová skvrnitost (*Ramularia beticola*), padlí řepy (*Erysiphe betae*), které může v nejhorším případě snížit výnos cukru o 6–10 %, a v neposlední řadě rzivost (*Uromyces betae*), která však v ČR nepředstavuje takový problém.

### Dávkování a doba aplikace

Ošetření je vhodné provádět od BBCH 40, kdy dochází ke kompletnímu uzavření porostu a většina rostlin sousedních řádků se nedotýká. Doporučené dávkování je 0,6 l.ha<sup>-1</sup> při dávce vody kolem 100–500 l.ha<sup>-1</sup>. Maximální počet aplikací v plodině je 2× za sezónu s intervalem mezi aplikacemi 14 dní. Ochranná lhůta je 21 dní.

### Doplňující informace

Ošetřené nadzemní části se nedoporučuje používat pro krmení hospodářských zvířat. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek, nebo jiný s obsahem účinné látky ze skupiny azolů po sobě; je vhodné kombinovat fungicidy s odlišným mechanismem účinku. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životního cyklu houby.



## DIFURE<sup>®</sup> pro

### Komplexní fungicid do cukrové řepy

EC - 150 g/l difenokonazol + 150 g/l propikonazol

- ✓ preventivní a kurativní účinek
- ✓ komplexní ochrana proti houbovým chorobám cukrovky a krmné řepy
- ✓ kombinace 2 účinných látek zvyšuje účinnost
- ✓ výborný poměr ceny a užítku

#### Regionální zástupci v České republice :

**Ing. Dita Kourková** - dita.kourkova@belchim.com,  
tel. + 420 727 858 856

**Ing. Robert Schäffer** - robert.schaffer@belchim.com  
tel. + 421 911 835 661 (+420 727 991 171)

**Bc. Jan Hesoun** - jan.hesoun@belchim.com  
tel. + 420 725 810 031

**Ing. Michaela Boušková** - michaela.bouskova@belchim.com  
tel. + 420 725 826 090

**Ing. Roman Lesa** - roman.lesa@belchim.com  
tel. + 420 727 840 406



[www.belchim.cz](http://www.belchim.cz)