

Tango® Super v cukrovce rozhodně nezklame: zkušenosti s tímto ošetřením jsou více než pozitivní

TANGO® SUPER IN SUGAR BEET CERTAINLY DOES NOT DISAPPOINT:
EXPERIENCE WITH THIS TREATMENT IS MORE THAN POSITIVE


Doporučená ochrana BASF

Tango® Super je jeden z nejpoužívanějších fungicidů v České republice, který pěstitelům nabízí vysokou profitabilitu s univerzálním použitím v cukrové řepě za výbornou cenu. Tento kombinovaný fungicid (obsahuje 84 g.l⁻¹ *epoxiconazolu* + 250 g.l⁻¹ *fenpropimorfu*) působí nejen proti nejvýznamnějšímu onemocnění cukrové řepy – cercosporové listové skvrnitosti řepy (dříve skvrnatičce řepné), ale také proti dalším chorobám – padlí řepy, ramuláriové listové skvrnitosti řepy (dříve větevnatce řepné) a rzivosti řepy. **Přípravek Tango® Super má preventivní, kurativní a eradikativní účinnost a je zaregistrován v dávce 1 l.ha⁻¹. Použití za vegetaci lze 2×.**

Efektivní ochrana cukrovky fungicidem Tango® Super vychází ze správného určení období počátku napadení porostu. Proto je základem pečlivá kontrola cukrovky již od počátku července. Kontrolu zaměřujeme na plně vyvinuté listy a počítáme podíl napadených listů. Intenzita napadení jednotlivých listů nerozhoduje, za napadený je počítán i list s jedinou skvrnou.

V našich pokusech v Evropě i v České republice bylo potvrzeno navýšení výnosu cukrové řepy v průměru o 4 % ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Účinnost na choroby je také vysoká. Proti cercosporióze dosáhl přípravek Tango® Super v 51 pokusech téměř **80%** účinnosti, proti padlí **93%** (v 35 pokusech), proti rzivosti **91%** (v 58 pokusech), a dokonce má efekt i na ramuláriovou listovou skvrnitost. Fungicid Tango® Super je váš spolehlivý ochránce porostů cukrové řepy proti houbovým chorobám s vysokou profitabilitou.

Snížení intenzity napadení cercosporovou listovou skvrnitostí



Podle výsledků pozorování a odpočtu mohou nastat dvě základní modelové situace:

Situace 1

Napadeno je více než 5 % listů – je nutné okamžité ošetření přípravkem Tango® Super.

Za tři až čtyři týdny provedeme nový průzkum porostu. Druhé ošetření je nezbytné, pokud je v dalším průzkumu objeveno do 30. 8. (při plánovaném pozdním termínu sklizně do 10. 9.) více než 60 % napadených listů. Tento model je určen pro střední a pozdní termíny sklizně.

Model ošetření: **Tango® Super 0,8 – 1 l.ha⁻¹**
+ Tango® Super 0,7 – 1 l.ha⁻¹.

Situace 2

Do 15. 7. není napadeno více než 5 % listů – není nutný okamžitý zásah. Pokračujeme však v dalších pravidelných průzkumech do 30. 8., a je-li napadeno více než 60 % listů, je nutné fungicidní ošetření přípravkem Tango® Super. Tento model je určen pro rané termíny sklizně.

Model ošetření: **Tango® Super 1 l.ha⁻¹.**

Závěr

Tango® Super nabízí prověřený systém, na který se lze spolehnout a který je prověřen jak v pokusech, tak i na provozních plochách u nás i v zahraničí. Zásadou ošetření je kvalitní fungicid aplikovaný na počátku infekce, který se v případě potřeby za cca 4 týdny doplní.

Antonín Dostál, BASF spol. s r. o.

Snížení intenzity napadení padlím řepy

