

MARIBO®

POWERED BY UBS

Odrůdy cukrovky MARIBO pro pěstitelský rok 2026

V září 2025 uběhl již rok od založení nové šlechtitelské a osivářské firmy pro cukrovku, krmnou řepu a čekanku United Beet Seeds. Tato firma vznikla fúzí Groupe Florimond Desprez z Francie a DLF Seeds A/S z Dánska. Nová světová firma UBS má kolem 900 zaměstnanců a je aktivní ve všech částech světa, kde se cukrovka pěstuje. Má sídlo v Tienen v Belgii a velmi rychle nastartovala nové aktivity ve šlechtění odrůd cukrovky pro všechny podmínky pěstování. Významně se rozšiřuje spektrum Smart odrůd cukrovky s rezistencí k herbicidu Conviso One od firmy Bayer. Nejen, že se u těchto odrůd zvyšuje jejich výkonnost, přibývají velmi rychle i odolnosti k hádátce řepnému, *Aphanomyces cochliformis*, SBR (syndrom nízké cukernatosti) a samozřejmě k *Cercospora beticola*. U odolnosti k této chorobě se již v roce 2026 objeví na trhu odrůdy cukrovky s označením „CERCOTECH“, to je odrůdy s velmi vysokou tolerancí až rezistencí k cercosporové listové skvrnitosti (*Cercospora beticola*). Produktové logo MARIBO je nyní obohaceno o doplněk „powered by UBS“, aby bylo zcela zřejmé, s jakými materiály se pracuje.

Co bude k dispozici na trhu 2026 a co bude nového?

V klasickém sortimentu odrůd (odrůdy nerezistentní ke Conviso One) bude stále k dispozici odrůda REGALIS, jako jedna z mála klasických cukernatých odrůd cukrovky. Svoji stabilitou ve zkoušení pro Seznam doporučených odrůd a dobrými výsledky v praxi je tato odrůda stále populární a její prodej v klasickém sortimentu odrůd v ČR v roce 2025 dosáhl 8 %. Dalšími stálíci jsou nematodní odrůdy FLAMENCO a VITUS, které

mají mimo jiné i velmi dobrou úroveň tolerance k *Cercospora beticola*. Odrůda FLAMENCO dosáhla ve zkoušení pro Seznam doporučených odrůd v roce 2024 na pokusné lokalitě Čáslav výnosu polarizačního cukru 19,9 t·ha⁻¹ a zařadila se tak do skupiny odrůd s extrémně vysokým výnosovým potenciálem. Odrůda VITUS je naopak známa jako odrůda velmi cukernatá v sortimentu klasických antinematodních odrůd, a to v delší časové řadě. Podíl prodeje v roce 2025 u odrůdy VITUS v klasickém sortimentu činil 10 %. To vše sečteno a potvrzeno spolu s velmi přijatelnou cenou osiva dává dobrou šanci těmto třem odrůdám uspět u pěstitelů i v prodejní sezoně roku 2026. V omezené míře bude zřejmě v nabídce také odrůda FD ALPINIST, která byla převzata od firmy Florimond Desprez a která je vlastně první registrovanou odrůdou v ČR vůbec s odolností k syndromu nízké cukernatosti (SBR) a jedná se navíc o vysoce výkonnou antinematodní odrůdu s vysokým výnosem polarizačního cukru.



S tímto logem „CERCOTECH“ se budou naši pěstitelé pravidelně setkávat. Jedná se o novou genetiku odrůd cukrovky s vysokou tolerancí až rezistencí k *Cercospora beticola*. Tyto odrůdy mají nejen vysokou odolnost k tomuto patogenu, ale jsou také velmi výkonné ve výnosu polarizačního cukru. Takovou první vlašťovkou tohoto sortimentu je odrůda MORAVIA, která byla v omezené míře již nabízena pro pěstování v roce 2025. Byla zaregistrována již po dvou letech zkoušení, dosáhla nejvyššího výnosu polarizačního cukru ze všech registrovaných odrůd v roce 2025 a na kontrolní odrůdy v polarizačním cukru měla index 109,9 %. Osvědčila se i v demonstračních pokusech v praxi v roce 2024, například v Unčovicích na Olomoucku se umístila na třetím místě s výnosem 112,7 t·ha⁻¹ při 16% cukernatosti. Odrůdou podobného typu je i odrůda MEDICUS, která je již zaregistrována na Slovensku a v Česku je ve třetím roce zkoušení.

Lze ovšem očekávat i registraci dalších odrůd tohoto typu, ve zkoušení ÚKZÚZ jsou nové odrůdy s vysokými indexy, které dávají předpoklad registrace již po 2. roce zkoušení:

– CAYENNE (MH 4105), jednoletý index 105 %, cukernatá odrůda s vysokým výnosem polarizačního cukru a dobrou výtěžností,

Obr. 1. Zhojená spála *Aphanomyces cochliformis*



Obr. 2. Příznaky SBR na mladých srdéčkových listech řepy



- TOKKEN (MH 4119), antinematodní odrůda s indexem 104,8 % a vysokou cukernatostí,
- NESSA (MH 4107), antinematodní odrůda s indexem 103,3 % a vysokým výnosem kořene,
- TABASCO (MH 4104), antinematodní odrůda s indexem 102,9 % a vysokou cukernatostí.

Ve 2. roce zkoušení ÚKZÚZ jsou s vysokými indexy přes 102 % také dvě odrůdy s vysokou tolerancí ke spále působené *Aphanomyces coenophialae*, a to ALVIN a KENNA. Spála působená patogenem *Aphanomyces coenophialae* je v posledních letech velmi vážnou chorobou postihující mladé rostliny cukrovky, které mohou zcela odumřít. Pokud dojde ke zhojení spály (obr. 1.) je růst rostlin oslaben, kořeny mají nižší hmotnost a nižší cukernatost a mohou se při sklizni lámat. Je také výrazně zhoršeno skladování takto napadené řepy.

SMART odrůdy cukrovky začaly být naším distributorem firmou Natura DK prodávány poprvé v roce 2025, balené ovšem ještě v krabicích našeho partnera ve fúzi firmy Florimond Desprez. V sezoně 2026 budou opět nabízeny SMART odrůdy třetí generace OSO a AGAME. OSO SMART je univerzální typ s vysokým výnosem kořene a dobrou odolností na *Cercospora beticola* a AGAME SMART je spíše cukernatý typ pro ranější termíny sklizně. V omezené míře zřejmě ještě bude k dispozici odrůda FD MANOIR SMART, která má velkou odolnost na kořenovou hnilobu působenou patogenem *Rhizoctonia solani*. Z nových odrůd se z Evropského katalogu registrovaných odrůd cukrovky mohou objevit novinky MARDUK SMART a FD STARTER SMART. Všechny uvedené odrůdy jsou v roce 2025 zařazeny do mnoha poloprovozních pokusů v celé ČR, takže pěstitelé se budou moci seznámit s jejich výkonností a také balení bude již v krabicích MARIBO.

Novinky ve šlechtění odrůd cukrovky

Nové trendy ve šlechtění odrůd cukrovky lze mimo jiné reálně sledovat i u odrůd přihlašovaných do prvního roku registračního zkoušení ÚKZÚZ. Naše firma přihlásila do 1. roku zkoušení v roce 2025 celkem 8 odrůd, z toho 4 odrůdy v kategorii SMART. Řada odrůd v klasickém i SMART sortimentu již ponese nové logo CERCOTECH – tedy mají výbornou toleranci až rezistenci k *Cercospora beticola*. Navíc jsou zde odrůdy s vysokou tolerancí k SBR (syndrom nízké cukernatosti) a většina přihlášených odrůd má vysokou toleranci ke spále řepy *Aphanomyces coenophialae*.

Novými hrozbami pro pěstování cukrovky jsou především virové žloutenky, které se začínají objevovat v porostech po zákazu moření osiva neonicotinoidy a mohou brzy dosáhnout i hospodářské škodlivosti. Novými patogeny cukrové řepy jsou ovšem i fytoplasmy přenášené křísy, a to jak choroba SBR (obr. 2.), tak především fytoplasma stolburu. Napadení stolburem na cukrovce se projevuje vadnutím až usycháním listů koncem července a v srpnu (obr. 3.) a gumovitostí kulového kořene (obr. 4.), které může být patrné někdy již koncem června. Odrůdy MARIBO a šlechtitelský genetický potenciál firmy je velmi bohatý na různé typy odolností vůči řadě patogenů, a to se prokázalo i v roce 2024. V tomto roce byla v Německu zaregistrována odrůda s názvem MULTIVIRA, klasická odrůda odolná k rizománii, virovým žloutenkám, SBR a stolburem. Odolnost k *Cercospora beticola* je střední a výkonnost odrůdy zatím průměrná v podmínkách bez napadení.

Obr. 3. Vadnutí a usychání listů řepy napadené stolburem



Při větším tlaku a výskytu některého z výše uvedených patogenů ovšem výkonnost odrůdy dramaticky stoupá ve srovnání s citlivými kontrolami. Odrůda je také letos zařazena na řadě polních pokusů v ČR a pěstitelé se tak mohou s touto novinkou seznámit.

Závěr

MARIBO a její zástupci v České a Slovenské republice jsou mezi pěstiteli velmi dobře známi a poskytují dlouhodobě kvalifikované odborné poradenství. Tato aktivita nabývá i nadále na významu, neboť se při pěstování SMART odrůd cukrovky začínají vyskytovat problémy se zaplevelením především rezistentními plevely k sulfonylmočovinám a bude nutné hledat k herbicidu Conviso One vhodné a účinné herbicidní doplňky. V ochraně cukrovky proti plevelům bude v klasických odrůdách od roku 2026 nově k dispozici herbicid RINPODE. Jeho správné zařazení a načasování v herbicidních postřikových schématech v cukrovce bude nutné také bedlivě studovat a sledovat účinnost. A zde se nabízí naše již dlouho známé firemní sdělení: „Od zasetí po sklizeň jsme s vámi!“

Vít Bittner

Obr. 4. Gumovitost kulového kořene po napadení stolburem

