

## Nové choroby na cukrové řepě: SBR a stolbur

V jižním Německu se tyto nové choroby stávají nejžhavějším tématem. V roce 2024 postihly už plochu větší než 70 tis. ha (20 % německé plochy řepy), často s velikým dopadem na výnosy i cukernatost plodiny (desítky procent). Postižený je zejména jihozápad země (Báden-sko – Württembersko, Hessensko, Bavorsko), ale dané choroby byly zaznamenány i blíže k nám, v Sasku. Závažné výskyty jsou ovšem také v Alsasku ve Francii, ve Švýcarsku, v Rakousku a na Balkáně (Srbsko). V Česku o jejich prokázaném výskytu aktuálně informoval článek Navrátila a spol. v časopisu Agromanuál (7/2025). Jedná se zatím spíš o ojedinělé, nikoliv plošné výskyty, bez hospodářských škod.

Základní informace o těchto chorobách pro české pěstitele byly publikovány v Listech cukrovarnických a řepářských: Vít Bittner popsal příznaky a rozšiřování v Evropě už v roce 2023, v roce 2024 doplnila informace o SBR Šafránková a spol. a přenos obou chorob hmyzími vektory Holý a Douda.

Důvodem, proč jsme zatím větších škod ušetřeni, je náš osevní sled: po cukrové řepě sejeme zpravidla jarní ječmen, nikoliv ozimou pšenici. Přenašeč choroby SBR (syndrom nízké cukernatosti), kříš žilnatka rákosní, přezimuje na kořenech ozimé pšenice, v případě po řepě následujícího jarního ječmene se přenos na další řepy snižuje o více než 90 %. Obě choroby většinou řepu napadají současně, SBR je však v německé diskusi označován jako vstupní, primární agens pro infekci stolburem.

*Jaromír Chochola*

